醫藥顧問

本欄問病。以本報之定戶爲限。非定戶而欲問病者。每一症須附問病費大洋五角。以示限制。朱振聲醫士答。

□陽痿丸方

(問)鄙人現年念八。尙未娶妻。因幼年時。智淺識微。即犯萬惡的手淫。今雖禁止。而已患陽痿不舉。及生殖器縮小不成形。以及小便急時。點滴難出。非用力不可。至解出時。祇有少許。待底衣紮好。回身走路。又想小便。走未數步。覺小腹脹滿。又想小便。豈知實深痛苦。近雖每晨服豆腐漿冲生雞蛋二枚。亦不見效。一因處境貧苦。二因社會上黑幕密佈。故迄未求醫服藥。自知此生已矣。以此終日鬱鬱。不知何日脫離苦海。幸面據友人說及先生爲醫界泰斗。熱心慈善爲懷。故此謹具手箋。並照例奉上問病費洋二元。伏懇　惠賜靈方。俾得早脫苦海。同登幸福之岸。則終身感戴　大德。決不忘也。最好賜一丸方。因鄙人在外服務。煎藥甚爲不便。(楊宜三)

(答)據來函所述。因早年誤犯手淫。致患陽痿不舉。生殖細小等症。良由斲傷太過。腎陽衰微。命火不能下驅宗筋。故陽道爲之萎廢而不振。生殖爲之細小而不全。至於小便點滴難出。而解後則覺少腹脹滿。又欲解者。此乃膀胱氣化失職。而約束無權也。今擬補腎益氣之劑。以丸代煎。緩圖功效。

淡蓯蓉二兩　淮山藥二兩
炙黃芪二兩　厚杜仲二兩
兎絲子一兩五錢　甘杞子二兩
潞黨參二兩　益智仁一兩五錢
巴戟肉一兩五錢　製首烏一兩五錢
大熟地三兩(大砂仁五錢拌內炙)　補骨脂二兩
白夕利一兩五錢　焦白朮一兩五錢
杭白芍一兩　淨萸肉一兩五錢
雲茯苓三兩　女貞子二兩
淮牛膝二兩　台烏藥一兩
福澤瀉一兩五錢
生苡仁三兩　炒枳殼一兩
陳廣皮一兩

以上各藥共研細末。再以鹿角膠三兩。用陳酒燉烊。溶化爲丸。如梧桐大。每晨及晚。空腹時各服三錢。淡鹽湯送下。

□頭痛如劈

(問)余患頭痛症。已二年矣。痛時勢如刀劈。且作眩暈狀。曡服各藥無效。懇求治法。(王德芳)

(答)丹溪云無痰不作眩。症屬肝陽挾痰上擾清空所致。宜天麻半夏石決湯主之。

明天麻八分。仙半夏二錢。生石決一兩。靈磁石一兩。白夕利三錢。青龍齒八錢。左牡蠣八錢。嫩勾勾(後入)三錢。大白芍二錢。荷葉邊一圈。

□崩後腫脹

(問)余妻年卅二。結婚已九年。曾生育四胎。產後每失於調理。故身體瘦弱。脾腎氣虧。經汛先後愆期。晨起便溏。溼滯來經停逾月。少腹滯痛。忽於上月廿二日起。崩漏不止。且多結瘀。一時元虛。陽亢不潛。驚惕肉瞤。寤寐欠酣。甚或眩暈模糊。掄進扶元益氣。佐以鎮攝之劑。延今症象雖平。而煩慮氣鬱。不耐勞動。偶然用力。崩下立見。腹部與四肢。有時腫脹。納穀顛呆。便已實。則見血。脈形微弦帶數。舌薄淨。可知久崩之後。氣血交衰。肝脾已無統藏之權。慮其變成虛損。用特略敍病緣。呈請台閱懇求立方施治。俾得藥到病除。無任感戴矣。(陳士宇)

(答)陰陽則不生。陽無陰則易解。兩相維附。不可偏廢。素體營陰本虧。加以崩漏之後。未免陰血過損。既不能奉養於心。又無以輸潤筋脈。以致驚惕肉瞤。寤寐欠酣。況陰虛不能斂陽。孤陽勢必上冒。此眩暈模糊之所由來也。考血生于心。藏於脾。統于肝。今肝脾兩虧。藏統失司。所以偶然勞動。即見崩下。且脾弱欠運。水濕泛濫。橫溢于肌表。則四肢爲之腫脹。阻遏于中宮。則納穀爲之呆滯。苦薄淨。脈弦數。弦爲木旺。數爲有熱。細參此症。皆由榮血太虧。衝任不固。陰虛于下。陽浮于上。惟欲潛其陽。必滋其陰。欲清其熱。必養其血。今擬膠艾四物湯。合三甲飲加減滋養陰血。而潛浮陽。調攝衝任。以固奇經。然乎否乎。尙希高明指敎。

阿膠珠三錢　生地炭四錢
大白芍錢半　左牡蠣四錢
廣艾絨八分　白歸身二錢
丹皮炭錢半　龜版三錢
炙鱉甲三錢　活貫衆炭三錢
血餘炭三錢　藕節炭二枚

伏暑醫療南鍼(十四)

宋愛人

論伏暑邪留脾胃濕熱鬱遏之極發黃衄血并出治法(十五)

濕鬱蒸熱。猶之霉雨時之潮熱。特甚也。熱與濕性相反。而類相同。故醫之治濕熱兩甚者。先要透熱於濕外。以分解其固結膠糊之勢。則濕既外透。熱亦內清。不然。但知見熱投涼。使其濕無出路。不明濕愈困緊。熱愈內焚。竟如製飴造醬。醞其黴腐。生菌病者。至此勢必腸腐潰膿。而淤熱鬱血之沉滯肌肉脈道者。尤爲發黃衄血之原因焉。蓋濕熱鬱蒸之極。肝管膽汁分泌不清。腸壁吸收功能減退。溢漏外滲入皮膚。而黃疸、晒成黃色鮮明者。茵陳知蘗湯。消息之。黃色晦黯者。茵陳理中湯。消息之。晦黯而、又洩瀉、口渴者。多不治也。其有血鬱積瘀。陽明衄絡。淸氣痺塞。血不能循經環行。而爲倒行妄流。陽明胃絡上交鼻孔。故爲衄血。凡漱水不欲嚥。汗出齊頸還者。均有衄血之傾向。治以淸絡化瘀湯。消息之。以透濕淸熱。自然脈道通暢。血行歸經。不治衄而衄自止也。斷不可大劑寒涼。轉增其瘀鬱痺塞之勢。轉致腐黃浮腫。便洩腹大。壞證已成。醫之過矣。

茵陳知蘗湯
綿茵陳　川黃蘗　肥知母　黑山梔　青連翹　白茯苓　薏苡仁　瓜蔞仁　香豆豉

茵陳理中湯
綿茵陳　製蒼朮　台人參　淡乾姜　製附子　白茯苓　廣陳皮　薏苡仁

清絡化瘀湯
烏犀角　西赤芍　黑山梔　川通草　象貝母　炒桔芩
綿茵陳　霍香葉　青連翹　白杏仁　瓜蔞根　鮮竹茹

論伏暑化燥灼傷少陰臟血衄血溲血并出治法(十六)

伏暑不從陽明經腑透洩淸解。且以其人精血素虛。火素旺。遂致伏暑化燥化火。燥火灼傷腎臟精血根本。撥動泉源。頓竭精氣。早已枯槁。血液又無依附。倒行逆上。血則較之九竅出血爲輕也。凡邪陷少陰、傷害精血者。其舌苦必枯萎紅絳。紅如豬腰。萎如秋葉。脈弦勁彈指。硬直不情。人必旦慧暮劇。煩躁懊憹。繁苛不堪。伏暑至此。已成敗證。治法當壯水之主。以制陽光。益腎之精。以滋陰血。然須大劑與之。以挽十一。然本證竟有誤汗亡血。慢溫傷陰。誤補澀熱毒。上壅而然者。爰作此論。以照炯戒。

加味犀角地黃湯
烏犀角　鮮生地　西赤芍　粉丹皮　粉甘草

如齦衄加生石膏。生知母。齒衄。加陳阿膠。寬麥冬。鼻衄。加京川貝。條仔芩。舌衄加京玄參。青連翹。金銀花。炒蒲黃。眼衄加羚羊角。東白芍。黑山梔。耳衄加。夏枯花。生石決。靈磁石。尿血加牛膝炭。苧蔴根。若大衄血而神情恍惚。面色皖白。勢將汗脫者。須重加老山人參以挽救之。然臨證用藥。猶賴變通也。

論伏暑陷入少陰腎陽虧餒證見脈脫神糊遺尿撤手并出治法(十七)

伏邪不論深淺。總以透達爲佳。惟腎陽虛則鼓蕩無力。無鼓動。卽陽電不能興奮。而至於沉滯無抵抗。雖有邪之淺者。亦將淪於旋轉深卒。至於沉滯不救之局。此何爲者。腎陽爲眞陽。此陽一虛。生機垂絕矣。伏暑傷陰而至於衄血齊出。此是敗證。難救。伏暑傷陽、而至於脈脫。神糊。亦屬敗證。難救。

凡遺尿爲腎絕。撤手爲脾絕。汗出如雨爲心絕。氣喘不續爲肺絕。今脈脫神糊遺尿撤手。已具脫象。惟舌苦淡白。胖嫩者。猶可參附溫補以冀陽回邪透。然又有脫象已著。而伏氣盤踞之甚。腎臟虛寒。胸脘之間。竟是一團烈火。則非有奇方不足以救其死亡也。然間有雖有奇方。而覺難於下手者。仍不足以救其死亡也。

參附保元湯
人參　牛附片　當歸身　北五味　炙黑草
眞山人參　山萸肉　酸棗仁　大黑棗
紫厚肉桂

李如珪女士著

(胎)(產)(問)(題)

今日出版

每冊四角

產科名家李如珪女士。浙江嘉善人。畢業於慈航產科學校。曾服務於中德產科醫院。近鑒於舊式收生穩婆。每以小小難產。輒致誤人性命。爰本其平素之學識與經驗。著成胎產問題一書。內容對於胎產生理。診斷。臨盆。手術。衛生。保護。以及鑒別胎孕之方法。預算臨產之日期。預知胎兒之男女。預防難產之方法。莫不有應盡有。詳加說明。且均根據科學原理。以期灌輸胎產常識於一般民衆。使不致再爲舊穩婆所誤也。

上海三馬路雲南路口幸福書局發行

長壽

于右任

每份四分　第二十九期

中華民國念一年十二月廿三日

內政部登記證警字第一一二七號

每逢星期五出版　全年五十期　連郵二元　國外加倍

館址　上海三馬路雲南路口幸福書局內

本期目錄

中醫處方用新度量衡制
楊梅瘡驗方
老白濁驗方
新白濁驗方
夢遺自療法
腎囊癢自療法
顛癇自療法
預防凍瘡及療法
逃淋濁因服草藥變成偏廢之治療
腋臭之新研究
房事動胎
治肺癰之特效藥
治百日咳奇效方
喉症預防法
保嬰之一法
白帶概論
陽痿丸方
頭痛如劈
崩後腫脹
伏暑醫療南鍼

◉本報特聘請吳之屏方家楨大律師爲常年法律顧問◉

實用驗方

▲楊梅瘡驗方

若楊梅瘡潰爛時。膿穢浸淫成片而痛者。以鵝黃散(輕粉石膏黃柏)摻之。又翻花楊梅。亦以本方加雄黃末。香油調敷之。外有護從丸。(雄黃川柏杏仁)于發瘡時令從侍人服之。可免傳染梅瘡。

▲老白濁驗方

據病家云。患老白濁。遍治無效。後服白木耳乃愈。初以爲偶然見效。不足爲奇。後屢試不爽乃信。

▲新白濁驗方

白濁有新老之分。新者指初起疼痛而言。老者指日久不痛而言。此方專治新白濁。方用生雞蛋一枚。挖一小孔。納入生大黃末一錢。用棉紙封好。置飯鍋燉熟。服之奇效。

▲夢遺自療法

凡有夢而遺。歷久不愈者。用川黃柏一兩。研爲細末。水泛爲丸。臨臥時服三錢。淡鹽湯送下。歷治數人均效。故錄之。

(按)夢遺大都由於相火太旺。鼓動精關所致。黃柏苦瀉相火。單用一味。其力尤專。故治夢遺頗效。

▲腎囊癢自療法

腎囊癢。俗名繡球瘋。因內有肝經之濕熱。外有風邪之侵襲。腎囊浸淫作癢。癢極難忍。茲有一法。可能除之。法用苦參片蛇床子各三錢。煎湯乘熱薰洗之。頗可奏效。

▲顛癇自療法

活磁石五錢。代赭石三錢。海浮石三錢。寒水石三錢。生石膏三錢。死楞子三錢。以上六味。生研細末。用砂鍋一個。先以陳石灰末攤勻。後將前六味藥末放於石灰之上。勿要混合。再將砂鍋封固。用慢火燒四點鐘。冷定。徐徐將藥末起出。不要石灰。切忌與石灰混合也。用時白水沖下三錢一劑。服六劑。神效。

明年元日起 中醫處方用新度量衡制

▲藥方之右加蓋新秤字樣
▲舊制一兩合新一・一七三〇

上海市醫藥兩業。改用新度量衡一案。(卽市秤)前經社會局令飭國藥同業公會議復。嗣經該業決定。於二十二年一月一日起實行。當由社會局函請敎育局。轉令各醫學團體。同時遵行。本市各醫學團體奉令後。迭經會商討論。並議定新舊漕平市秤對照表。會銜粘呈市敎育局。茲聞此事本市全體國醫。均已決定遵令於明年元旦起。處方卽用該表分量核實。幷於藥方之右。加蓋「以上藥品均係新秤」字樣木戳。新聲社記者。以此事關係病家服藥。甚爲重要。有將中醫處方。其中一二藥品。亦有病家自備者。其新舊度量衡折合辦法。必須詳細明晰。以免貽誤。特向神州國醫學會詢得折合表及說明如下

▲折合

漕平一合市秤一・一七三〇。一・五合市秤一・七五九五。二合市秤二・三四六〇。二・五合市秤二・九三二五。三合市秤三・五一九〇。三・五合市秤四・一〇五五。四合市秤四・六九二〇。四・五合市秤五・二七八五。五合市秤五・八六五一。五・五合市秤六・四五一六。六合市秤七・〇三八一。六・五合市秤七・六二四六。七合市秤八・二一一一。七・五合市秤八・七九七六。八合市秤九・三八四一。八・五合市秤九・九七〇六。九合市秤一〇・五五七一。九・五合市秤一一・一四三六。

▲說明

(一)本表係根據國民政府公佈市用制之規定漕平。卽上海十六兩天平。每一斤或一兩。等於市斤或市兩(一・一七三〇)折合。(二)茲爲吾醫界便利起見。特畧述之。按舊制漕平一斤。分爲十六兩。而新制市斤。亦爲同樣十六兩之相定。故斤與斤間之比例。及兩與兩間之比例。均爲(一・一七三〇)。(三)舊制漕平一兩。合新制市斤(一・一七三〇)兩小數後之(一七三〇)。得稱爲一錢七分三厘。因兩之後。皆由十進。以次推下也。但同時斤與斤之比例。因市斤仍爲十六兩之故。小數前之(一)當爲一斤。小數後之(一七三〇)。係表示十分之(一七三〇)斤。則應以十六乘之。得(二七六八)。卽二兩七錢六分八厘。如問舊制漕平一斤。等於新制若干。則應答爲一斤二兩七錢六分八厘。(四)按我醫界習慣。所用分量。如一分。分半。二分。一錢。錢半。二錢。以重一兩。兩半。二兩。則本表雖屬簡畧。但已足應用。舊制漕平一兩。合新制市斤一兩一錢七分三厘。漕平一錢。合新制一錢一分七厘三毫。因本表所例皆係比數。故無一定單位。究係何種單位。則於應用時視舊制之單位定之。(五)以上所云。係由舊制折合新制。若由新制折合舊制。則(一・一七三〇)除(一)卽得(八五二五)。合八五二五折。新制市斤十六兩。以(八五二五)乘之。得舊制漕平十三兩六錢四分。藉以明瞭起見。亦述及之。但實際并不需要。故不另製表。

□保腦丸之發明

發明保腦丸者。非醫家乃病家也。病家無醫藥知識。何以能發明。曰。從實驗中得來。當其患腦病劇烈之時。中西名醫。百治無效。後無意中服此藥。竟效。於是有此丸之發明。

□保腦丸之功效

余戚某氏。亦患腦病。始則鼻流濁涕。腦目昏糊。繼而記憶薄弱。精神不振。卽以此藥試之。不數日而愈。其功效之神速。非他藥所可比擬。

□保腦丸之服法

保腦丸之服法。極爲簡便。既無煎煮之勞。而且攜帶便利。祇須在飯後用白開水吞服三錢。小兒減半。

□保腦丸之價目

保腦丸祇有一種。每盒大洋五角。不折不扣。每打五元。

廣東鄭震發明

上海三馬路雲南路幸福書局代售

李健頤氏秘製

▲清嗽粉　▲治嗽良藥

每包大洋一角
此藥爲清肺疏風之聖藥專治風寒咳嗽喉實發痒肺炎失音胸痛氣促肺痿肺熱咯血百日咳并發喘急等症無不兼療屢經試驗皆著奇功

▲痢敵　▲治赤白痢特效藥

每包大洋一角二分
此藥專治赤白痢疾性質和平不傷元氣最爲靈效乃百發百中之良劑也又能兼療胸腹積滯絞腸扭痛胃發酸氣嘔噁燥心口吐清水胃痛酸等証不分男女老幼均可服用

總發行所福建平潭五廟后街徐慶棠製藥局

代售處上海三馬路雲南路幸福書局

中華郵政特准掛號認爲新聞紙類

□預防凍瘡及療法

郭紹庭

現在天氣已漸漸寒冷。差不多快要發生凍瘡了。要知道人們爲什麼發生凍瘡呢。因爲天空中溫度低降。人們常露在外面的體膚。如耳顴手臂足踝等部。失其強大抵抗的本能與保護。終日被寒冷侵襲。在初則血管收縮。致血液循環不足。呈蒼白之色。繼乃血管擴張。變爲紫紅色斜斑。此時已誘起掀癢腫痛。由是而水泡。而破潰。終必腐爛而後已。若不設法預防於未然。或覺神效處方治療於發生之後。則凍瘡的痛苦。也不能算小。歐西因凍傷全身而發生危險者。曾數見不鮮。我們中國尤不可不注意及之。今將預防療法及經過時期。誌錄如下。

(甲)預防方法　天氣將寒未寒之時。凡有凍瘡患者。須注意以下各點。

(一)易罹凍瘡各部。在凜寒未至之時。宜保守皮膚清潔。並擦取富於脂肪之物。如歪子油之類。以營養其生體。

(二)宜常用保溫之法。如鞋襪手套。須擇其適合者用之。不可過大過小。因爲過大不能保溫。過小則又有妨礙血行之弊。皆能誘發本病。

(三)無論手足下冷水熱水之後。總要用乾燥之布。將手足拭乾。在未拭乾之前。萬不可圍爐烘火取煖。以致體膚皸裂。而成本病。

(乙)治療方法　凍瘡之徵候。輕則名曰凍瘡。重則名曰凍傷。凍傷德名(Congelatio)乃天氣寒冷侵襲。冬季常見之傷也。惟發生程度。有輕重不同。但經過時期。大別爲三。茲將各期治療法錄左。凡有凍瘡患者。注意及之。

(一)紅斑時期　當天時寒冷。氣溫下降。凡人之體膚暴露於外各部。受寒氣侵襲者。莫不發生紅斑。蓋此時人體血管收縮。血液循環因以阻礙。假使此際以「生薑」擦之。或以「樟腦」泡「火酒」擦之。(如無火酒用原燒高粱代之亦可)或以「碘酒」擦之。均可治療痊癒。因「生薑」「樟腦」「火酒」「碘酒」均能助血液流行也。若此時不用上法療治。迨經過三四日。則此紅斑或仍消散無存。但是不數日復行紅腫疼痛。成紫色之腫瘍。甚有冬日未舉發。而春日融和時反發生本病者。殆即由於此血管擴張之原因也。

(二)水泡時期。其原因係小靜脈血液。爲寒冷之氣侵襲。血管收縮。不能輸入大靜脈中。遂至凝滯浮腫。而成水泡性之腫瘍。迨水泡破裂。則潰瘍成矣。至療此潰瘍之方法。可用「官桂」「香附」等分爲細末。以熟猪油調勻塗之。或以「碘酒」塗擦亦可。倘若水泡破潰。須照潰瘍療治。其法用「黃蠟」三分「蔴油」七分熬膏塗之。如不能愈。稍加「珍珠散」亦可。蓋官桂。香附。有祛寒散血之功。蔴油。白蠟。有潤膚生肌之效。

(三)凍痂時期　水泡破裂成潰瘍之後。該部之營養全失。感覺毫無。皮內所含之血液。乃轉歸於組織破壞之處。呈暗青色之水泡痂皮。療治之法。須恢復其營養，如擦面之歪子油。時時塗擦。亦可痊愈。

附錄陳禹鼎之凍瘡簡治法。

未破者用黃柏末(三錢)朴硝(錢半)和調敷之

已破者煅兎楞子(三錢)研極細末芝蔴油調敷

□述淋濁因服草藥變成偏墜之治療

(商智)

偏墜者。睾丸偏大下墜是也。屬於左丸者居多。患淋濁者。妄服草藥刼制其毒。亦成是症。蓋淋濁之原料。原係敗精瘀濁造成之毒素。以故莖中刺痛。尿出如火。龜頭紅腫。滴瀝不暢(陽事易舉。濁液常流。此時而用宣濁導瘀。蕩滌毒菌之法。自無變成偏墜之虞。乃病者急於求效。偏信草頭方藥刼制一時。而不知毒欲潛伏於精管者。無從發洩。勢必轉返於精囊。而影響於攝護之線。經脈弛張。大如拷拷。迨偏墜既成。梗觸股際。妨碍行走。治不如法。變爲錮疾。而致終身之累。可不懼哉。爰錄二案於後。

歙人汪輔賢年三十四歲。日夕馳逐於花柳之場。患淋濁症。服草藥數料。脹疼漸減。左睪丸忽然腫大。未四五日。狀如牛卵。小便短赤。濁液特流。腰痠頭重。身體四肢。冷痠如雲片狀。奇癢不堪。夜不安眠。按其脈細而濇。毒氣鬱於下。風濕襲於外也。用橘核仁三錢。海藻三錢。地膚子二錢。川柏二錢。車前子二錢。沒藥二錢。小茴香五分。川楝子二錢。廣木香二錢。白蒺藜二錢。三劑而濁液減。小便利。冷痠除。左睪丸脹大。減去其半。但腰痠之極。不能久坐。色慾過度。腎將憊矣。改生祁朮三錢。雲茯苓二錢。橘核仁三錢。廣木香錢半。海藻三錢。炒川柏六分。川楝子二錢。全歸錢半。小茴四分。四劑而痊。

又紹人葛雲初患淋濁。服草頭方。淋濁漸愈。而左睪丸脹大。少腹筋攣如著。小便赤澀。脈滑下駛。誤用刼藥。阻塞瘀濁之流行也。用濟生橘核丸。橘核仁一兩。川楝子一兩。桃仁一兩。海藻一兩。海帶一兩。昆布一兩。姜川朴四錢。枳實四錢。廣木香四錢。大木通四錢。川柏四錢。車前子四錢。(按此方原有肉桂。以小便熱赤。內有毒火。易柏車二味)酒糊丸。淡鹽湯下。一料而愈。

查墜之原因不一。有遺傳者。有奔走過度而得者。有因勢觸而成者。各隨所因治之。上述二症。因服草藥變成癥。特其一耳。外治之法。灸洗皆不可廢。然不痛斷房事。輕者隨愈隨發。重者終成癩疾。

腋臭之新研究

(西神)

人身之皮膚。除汗脂外。並不絕發散瓦斯及水分。依其成分之多寡而氣味各異。西洋人謂東洋人身上有一種之臭氣。東洋人則謂西洋人身上有一種臭氣。即同是東洋人或西洋人。各人之臭氣。亦各不相同。犬之所以能追尋主人之蹤跡者。因犬之嗅覺非常銳敏。能嗅主人之臭氣也。該臭氣與汗一同發散。故臭味強者。名臭汗症。臭汗症之中。有發自全體者。有發自身體之一部分者。腋臭是也。

腋臭有二種。一爲平生汗多之人。腋下滲出汗許久。不立即拭去之。致出汗後分解變質。同時皮膚爲之少糜爛。而腋下乃放出一種之臭氣。是名臭汗症。非眞正之腋臭。且不僅限於腋下。凡出汗多之地方。概放一種之惡臭。所謂眞正之腋臭者。雖日日清潔腋下。汗出即拭之。仍有一種之惡臭也。

兒童患腋臭殆無。大抵至十四五歲。腋下生毛。汗腺十分發育。出汗過多。於是始發腋臭。及年齡衰老。皮膚收縮。汗腺亦萎縮。出汗較少。故老年人中發腋臭者亦甚少。至腋臭之臭氣中。揮發性之脂肪酸居多。某學者謂幼時有耳漏症者。成長後。必患腋臭。由此觀之。則雖清潔皮膚之人。皮膚仍放臭氣。與胃內並不患病而口臭者同。乃關於人之體質者。腋臭能遺傳於子孫。惟無黴菌之作用。故不能傳染。

西洋人患腋臭者甚多。婦人尤較男子爲多。此因西洋人朝夕乾拭身體。不用湯水。而婦人則衣服裹緊身體。腋下不通風。致腋下之汗及脂蒸發而成汗臭症。但西洋人多不視爲腋臭。而視爲汗臭。婦人請醫生醫治腋臭者甚少。腋臭之惡臭。大抵通汗腺而與汗一同發散。故汗之多少。與腋臭大有關係。患腋臭者。於出汗最多之夏日。臭氣難堪。至不出汗之冬日。毫不發臭氣者甚多。又精神受強烈之感動。如驟見恐怖之物。而生畏懼之念時。則發強烈之惡臭。蓋心中生畏懼之念。則腋下出汗必多故也。

汗出即洗之。暑時不爲過烈之運動。不出多量之汗。不衣緊狹之衣服。日日清潔腋下。使通風。則汗氣自無。茲記普通人之治療法於下。朝晚用溫湯洗之。塗酒精於布上拭之。俟其乾後。塗布五十倍之撒里矢爾酸澱粉Amylum Salicylicum單納仿謨Tannoformiam之粉末酒石酸Acidum tartaricum硝蒼Bismuthum nitricum之粉末。頗有效。惟重症非請醫生醫治不可。

上海新新公司　常年醫藥顧問

朱振聲醫士

診例

(甲)門診一元　號金不收
(乙)出診四元　路遠遞加
(丙)膏丸方四元　隔日取件
(丁)外埠問病二元　原班回件
(戊)急病隨請隨到

時間　門診上午九時至下午四時止　出診四時以後

診所　上海雲南路會樂里第一弄第一家

電話　九一四九二

掛號處啓

◉朱振聲醫士編著之醫藥常識書

婦女病全書	二冊	實售大洋一元
家庭醫藥常識	一冊	實售大洋八角
百病秘方	一冊	實售大洋四角
保臚新書	一冊	實售大洋四角
腎病研究	一冊	實售大洋四角
長壽彙選	一冊	實售大洋六角
怪病奇治	一冊	實售大洋八角
咳嗽自療	一冊	實售大洋二角
驗庭實用家方	一冊	實售大洋一角

診餘隨筆

房事動胎（五）

朱振聲

性慾一事。甚難控遏。青年男女。愛情篤厚者。其發動尤易。往往於懷孕以後。尙不知節制。恣情妄爲。以致動胎小產。蓋亦屢見不鮮矣。

性慾之發動。乃生殖力之表現。夫婦行房。本以妊娠爲目的。既懷孕矣。固無庸再交接也。然孕後禁止行房。其勢良難。雖古有「上士異被。中士異牀。下士異室」之說。實際上決難免除。且女子懷孕。一時亦不易發覺。多有於三四月後腹部隆起而始知受孕者。信如此說。則一次行事之後。必須視察多時。確知未曾受孕。方有再行房事。此則未免迂腐過甚矣。孕後行房。苟非有害之時。偶一爲之。亦可無妨。但須謹愼。切勿過度。以致女子感受疲乏。女若不喜時。亦不可勉強。又或腹內有異常之感覺。及交接時覺痛苦及不快者。皆宜嚴禁。恐致小產。素有小產之習慣。尤宜禁止。

房事動胎。大半因動作過劇之故。此症於診斷上頗難得其扼要。蓋胎動不安。雖其原因不同。而證狀則並無十分顯明之分別。故當不厭其詳。詳細探問。然房事一項。涉及隱秘。問者難出諸口。答者則益覺含羞。又當委曲以求之。病情旣明。用藥庶可無誤。

友人陳炳均之婦。孕已六月。忽然漏紅。且腹部不適。有異常之感覺。以爲有流產之虞。邀余往診。察其脈。尙屬牢強。或不致牛變。探其原委。知爲房事過度之故。緣友朋之間。無所不說。陳君性又爽直。故能盡情以告。乃爲疏一方。用熟地四錢。歸身二錢。炒白朮錢半。炒白芍錢半。炒阿膠六錢。醋炒艾葉一錢。黑芥穗錢半。炙潞黨三錢。苧蘇根三錢。連服三劑而安。

大凡婦人胎動或胎漏。雖不盡屬有墮胎之變。然多爲墮胎之先兆。此際當辨之於脈。如脈見牢強者。可以安之塞之。設脈過於滑利。胎必墮落。不必勉強堵塞。反生他變。

□育兒日記。因來稿未到。暫停一期。　編輯部啓

治肺癰之特效藥

（鈕菊軒）

震澤湖邊。萬山環立。有形如元武者。厥名龜山。多魚腥艸。方士常採取以治肺癰。艸長尺許。葉長圓如海棠。色青。稈中含潔白汁甚多。腥臭特甚。余嘗栽之牆角。欲證明其實驗也。

有富商沈某之妻。患肺癰甚劇。四方名醫。幾盡遍延。然百藥罔效。垂危已極。後聞吾師名。(楊志平)請求一診。諾之。余隨同往。至則見病者胸脇脹滿。上氣喘急。呻吟不甯。欬嗽則大痛。痰中帶血。氣味極臭。目突面浮。檢前方皆葦莖大棗瀉肺湯。出入加減。已服數十劑。吾師顧爲余曰。此肺癰已至末期。徒用瀉肺。肺氣盡則死矣。惟余所言魚腥草。可一試之。即詳示地點。使專足覓之。另煎吉林參二錢。白芨二兩。然後將魚腥草搗汁和勻。儘量服之。毋使間斷。告以一星期後復診。余猶疑爲效否未卜也。不料一星期後。果來邀診。並喜形於色。稱謝不已。謂服藥一二日。即上氣向下。其聲如雷。膿血驟減。三四日。面浮咳嗽漸平矣。噫此誠非意料所能及。宜方士採取者之多也。後遇霍姓老嫗。患是病。服是草。亦效如沈妻。考此草綱目未有搜羅。本草並無記載。即醫學大字典。有其名而未載其用。不敢自祕。質之高明。與研究藥物者。　(不受酬)

□治百日咳奇效方

劉琴仙

近日嬰兒。多患頓嗆咳。西醫名百日咳。某西醫曾發表論文。洋洋數萬言。已由某書局印行單行本出版。然一探其治法。功效甚微。反不如土藥之神效。余戚某孫女年七歲。患百日咳。已有月餘。連嗆數十聲。痰甚難出。初服潤肺等藥無效。繼服西藥司各脫繁魚油。及安替批林等。更不合。此時咳必吐鮮血盈杯。面目浮腫。挽余診治。適友人何君亦在。何君曰。吾有經驗簡方。祇用荷葉蒂(去蒂)數個。煮湯。調鍋底焦(即百草霜。吹去煤。研末)空心服便效。余然其言。使取服之。是夜果停止咳嗽。安睡通宵。次日略咳。則痰去血亦少矣。連服數次而愈。誠妙藥也。

□喉症預防法

(佚名)

每當秋冬氣候乾燥之時。喉症流行最盛。每易傳染。大可慮也。預防之法。可常食梨與蘿菔。橄欖荸薺等清涼之品。并戒烟酒等辛熱物。又須時時至空曠處。吸取新鮮空氣。切忌多人共居隔室之內。庶可免除喉症矣。

□保嬰之一法

(醉痴生)

嬰兒初生。或一二日。或三四日。牙齦忽起脹硬。不能吮乳。是謂撮口。(俗名板牙)家人不知治法。往往倩穩婆。以針刺牙齦上下數十針。用棉拭其血。雖當時稍能吮乳。然至次日。牙齦仍硬。亦有連刺四五日。出血甚多。仍無回復其吮乳之效者。以初生小兒。受此痛楚。其何以堪。根本之治療。宜先審察嬰兒之乳部。其兩乳必有硬塊。如小蒼大。即以口徐徐吮之。復輕輕擠其乳。即有白色之乳汁迸出。一日夜凡擠五六次。迨至乳汁擠盡。則牙齦腫硬自平。此法頗有奇驗。第知者尙鮮。爰表而出之。以告世之育嬰者。

□白帶概論

李健頤

女子白帶。與身體大有關係。不可不早爲療治也。其原由雖多。約言之。不過濕熱二者而已。任督帶三脈。皆通於子宮。任爲引血機關。循行於經絡。督爲司精之重器。輸送於睪丸。帶脈者。所以約束胞胎之系也。如濕熱伏於任脈。則任脈弱。而乏引血之能。血中夾濕。復加膀胱之氣不化。濕熱蒸成一種黏膠之物。溢於帶脈。遂復泄於外。如清米泔。或黏膠如帶。故名曰帶。濕甚於熱。爲白帶。熱甚於濕。爲赤帶。更有濕熱伏於督脈。精與濕熱混和。遂蒸練一種白物如涕如涶。泄流於外。淋漓不絕。即內經所謂白淫。亦帶之一種也。治法皆宜清熱化濕爲主。世人不知療法。往往用補濇之味。遂愈補而症愈重。甚至濕熱猖獗。延爲骨節痠痛。咳嗽聲啞。咽乾燥悶。諸症蜂起。余潛心研究。乃知帶爲濕病。宜先清熱去濕。如任脈無濕熱爲害。任脈自強。血液流通。則能生精化氣。精氣充滿。吸入督脈。督是全身諸脈之總司令。督脈強。則諸脈皆強。況帶脈者乎。余經十餘年之考驗。搜集最效古方。重爲加減。臚列于下。以爲參考。

(一)側柏樗皮丸。沈氏尊生書方側柏葉五錢。樗根皮二兩。香附(醋製)白芍藥白朮各一兩。川連黃柏(炒)各五錢。白芷灰二錢。桑螵蛸萆薢各一兩。升麻五錢。西洋參四錢。共研細末。米粥爲丸。如梧桐子大。每服三四十丸。熱湯送下。　按側柏白芍。補任脈而帶涼血。樗椿皮白朮。運脾胃而兼去濕。連柏清帶脈溼熱。香附白芷。化氣散滯。夫濕爲氣滯。氣化則濕亦化矣。再加桑螵。補腎陰。萆薢分清濁。升蔴洋參。以升其氣。氣升則清者之精血。上補於腦。而不致下泄與濕熱合化而成帶病也。

(二)易黃丸。傅青主方懷山藥蘇芡實各二兩。黃柏八錢。車前子六錢。白果肉一兩。萆薢五錢。知母(炒)五錢。冬蜜練丸。每服三錢。米湯送下。　按山藥芡實白果。補脾化濕。黃柏清熱去濕。脾受補則易於消化。而無滯膩之弊。佐以車前萆薢。清熱滲濕。此方有補脾化濕。清熱之妙。而無滋弊也。二方服後。可與調補之品。自可收功。屢試屢驗。望世之婦女有患此症者。注意之可也。